

80歳までに約 **3** 人に **1** 人が発症^{※1}

带状疱疹の予防接種

带状疱疹について

带状疱疹は水ぼうそうと同じウイルスが原因で水ぼうそうが治った後もウイルスが体内に潜み続ける特徴があります。そのため過去に水ぼうそうに罹ったことのある人は免疫の低下、疲労・ストレスなどでウイルスが再活性化して带状疱疹を発症します。特に50代頃より発症率が高くなり、そして約6%の割合で繰り返し発症する場合があります。^{※2}



主な症状

上半身(お腹周り)、顔や目の周りの神経に沿って赤い斑点と水ぶくれが帯状に生じます。夜眠れないほどピリピリとした強い痛みがあり、神経を損傷すると痛みが続く「带状疱疹後神経痛」や部位によっては角膜炎や難聴などの合併症を引き起こす場合もあります。



※1 Shiraki K. et al.: Open Forum Infect Dis. 4(1), ofx007, 2017 ※2 Shiraki K. et al.: Open Forum Infect Dis. 4(1), ofx007, 2017

50歳からのワクチン接種

獲得した免疫(抗体)は、年齢とともに弱まります。50歳以上の方はワクチン接種を受けましょう。

1回/22,000円 ※計2回のワクチン接種が必要です。

市町村によって補助金が出る場合がございます。詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。